

DISSERTATIO MEDICA
 INAUGURALIS,
 D E
 ULCERE UTERI:

Q U A M,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendæ admodum Viri

D. JOANNIS GOWDIE,

ACADEMIAE EDINBURGENAE PRAEFECTI,

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,

Et nobilissimae FACULTATIS MEDICAE decreto;

Pro GRADU DOCTORATUS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

GULIELMUS BROUGHTON, HIBERNUS.

Ad diem 6 Augusti, horâ locoque solitis.

EDINBURGI:

Apud G. HAMILTON & J. BALFOUR

ACADEMIAE TYPOGRAPHOS.

MDCCLV.

DISSEMINATION

OF THE

RECORDS

OF THE

RECORDS

OF THE

RECORDS

OF THE

RECORDS

OF THE

RECORDS

OF THE

RECORDS

OF THE

RECORDS

OF THE

RECORDS

OF THE

RECORDS

OF THE

RECORDS

OF THE

RECORDS

OF THE

DISSERTATIO MEDICA
IN AUCUVALIS
D. THOMAE BROUGHTON,

MERCATORI DUBLINIENSI,

PATRI OPTIMO,

BENIGNISSIMO,

SUMMA, QUA DEBET, REVERENTIA,

ANIMOQUE GRATO,

D. D. C. Q.

FILIUS

GULIELMUS BROUGHTON.

THE JOURNAL OF

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
ULCERE UTERI.

STRUCTURA delicatior, et munera vitae quibus a natura designantur, sexum pulchriorem, sed eo magis imbecillem, multis morbis et incommodis, quibus mares vivunt prorsus immunes, a teneris etiam annis subjiunt. Sortem ergo foeminarum lugens, et, quamplurimum in me est, adjuvare sperans, dum legibus academiae obtemperem, de ulcere uteri, malo eas frequenter vexante, sed parum hactenus tractato, differere volo.

Quemadmodum

Quemadmodum in caeteris partibus, sic in utero, fit ulcus; quod est solutio continui cum pure: fit autem triplici de causa.

1. Ab inflammatione suppurata; ruptus enim et evacuatus abscessus in ulcus vertitur.

2. A vulnere utero inflicto, quo uteri tunicae dilacinantur; quod ex labiorum suppuratione in ulcus brevi degenerat.

3. Ab erosione sensim facta, quâ uteri tunicae abradantur; haec autem erosio infertur a pessariis aut injectionibus acrioribus; a foetu mortuo; ab unguibus imperitae obstetricis; ab immodico fluore albo, diuturno, viridi, et erodente; a humore uterino viru siphilitico inquinato; a pure extremum
uteri

uteri os astringente in gonorrhoea virulenta, quae sedem habet in glandulis vaginae et uteri. Ulcera multiplici ratione differunt a se invicem.

1mo, Ratione causae; sic alia ab inflammatione, alia a vulnere, alia ab erosione fiunt.

2do, Ratione magnitudinis; sic alia lata, sed superficialia; alia quidem profunda, sed angustata; alia fistulosa sunt, quae modo per medias uteri tunicas serpunt, modo per vaginae superjectas communicant, modo in intestinum rectum aperiuntur, modo ad alias pelvis partes protenduntur.

3tio, Ratione mali; alia benigna, et haec pus paucum coctum album et parum graveolens emittunt, et non multo dolore stipantur; alia maligna et cachectica,

cachectica, quae pus tenue, acre, sanguinolentum, grumofum, inaequale, foetidum emittunt, et fumme dolorifica sunt; alia demum cancrofa feu carcinomatodea, quae nullum vel pauciffimum effundunt, et atrociffimis doloribus cruciant,

4to, Ratione fitus; fic alia, uteri fundum, alia, partes laterales anticas aut posticas, alia, cervicem et osculum ipsum, occupant. Ex nota ulceris natura, facile est, fympptomata quae infert, explicare.

1mo, Dolor adest; quia pus acre fibras nerveas partis internae fortiter lancinat.

2do, Vigiliae; quia fibrae cerebri a dolorificis refluxibus qui ab utero fiunt perpetuo

perpetuo quassatae, sensum doloris continuo menti afferunt.

3tio, Febris lenta seu hectica ; quia acria miasmata, quae ab ulcerata parte sanguini transfunduntur, ejus motum praeternaturaliter intendunt. Huic autem febri superveniunt symptomata omnia febribus hecticis essentialia ; nempe marcor seu marasmus, exacerbationes nocturnae, sudores matutini, diarrhoea, unguum incurvatio.

4to, Rhagades seu phlictinae in vagina accedunt.

5to, Dysuria.

6to, Si ulcus uteri fistulosum cum vesica communicetur, pus una cum urina per urethram, et vicissim urina cum pure per vaginam, emittetur.

7mo,

7mo, Pari ratione, si ulcus uteri in rectum penetret, pus cum faecibus alvinis prodibit, et, vice versa, faeces liquidiores cum pure per vaginam.

8vo, Quod si ad pelvis latera protrahatur, vel ad os sacrum, ad foramina ovalia, vel ad varias pelvis et musculorum partes, dolore fixo et duritie renitente manifestantur.

DIAGNOSIS.

Ulcus uteri facile dignoscitur. 1mo, Ex dolore fixo in utero. 2do, A puris effluxu, qui ulceris existentiam demonstrat. Cognatos duos habet, nempe fluorem album, et gonorrhoeam virulentam. A priore distinguitur, tum constantia doloris, tum veri puris effluxu, quod utrumque in fluore albo abest; a posteriore vero distinguitur,

guitur, tum fede, tum scaturigine purulentae materiae: siquidem in ulcere uteri dolor in utero sentitur, a quo pus emanat; in gonorrhoea vero virulenta, dolor vulvam aut vaginam discruciat, ex quibus quoque materia purulenta fluit. Variarum causarum, quibus uteri ulcus refertur, dignoscuntur ex praegressis circumstantiis. Reliquae vero ulcerum uteri differentiae vel a tactu, vel a dolore, vel a natura puris dignoscuntur: si vero fistulosum fuerit, ad vesicam aut rectum protenditur, aut per varias partes pelvis cuniculos agit, manifestum fiet faecum aut urinae inspectione.

PROGNOSIS.

Ulcus omne uteri periculosum est. Immo, Ratione partis, quae, cum sit exquisiti sensus, dolores gravissimos excitat,

citatur, et in gangraenam facile abit. 2do, Ratione symptomatum, ut febres lentae quae miseras aegrotantes tacita labe consumunt. 3tio, Ratione situs, unde nec debito modo detergi, nec convenienter exsiccari, et cicatrice obduci potest. Periculum vero quod

ab ulcere uteri pendet, varium est. Imo quidem, Ulcera cachectica, cavernosa, fistulosa, fere semper insanabilia sunt: contra vero, curantur facilius ulcera benigna, angusta, superficialia. 2do, Aegerrime curantur ulcera quae ab erosionem oriuntur, ob adjunctam sanguinis dyscrasiam, qua fovetur: contra vero, facilius quae ab abscessu aut vulnere, modo levia sint, producuntur. Ulcus quod a siphilitide dependet, sanatur commodius quam ulcus quodcumque ab alia causa inductum; quia, profligato semel viru venereo, tollitur antecedens morbi

morbi causa, et ulcus benignam naturam acquirit. Tandem, ulcera quae uteri cervici insident, tutius et promptius curantur, quam quae profundiora sunt.

C U R A T I O.

Ut ulcus uteri cicatrici coeat, imo quidem, corrigenda est sanguinis dyscrasia. 2do, ulcus ipsum convenientibus remediis oppugnandum est.

Sanguinis dyscrasia in ulcere uteri, vel a viru venereo quo inquinatur, vel a vitiosa acredine qua inficitur, dependet. Si prius, hydrargyrosa in ulcere uteri adhibenda; quae debellando siphilitico contagio unicum esse remedium constat. Si vero posterius, remedia varia in usum promovenda sunt; quae, imo, Saliū sanguine luxurian-

luxuriantium copiam evacuare per cutem, renes, aut intestinales glandulas, apta sunt. 2do, Quae relictas salium moleculas dissolvere possunt. 3tio, Demum, quae eas immutare et ca-
stigare possint.

Imo, Adhibenda sunt purgantia blanda saepius repetita. Cathartico-
rum usui adhibenda sunt juscula ama-
ra et diuretica, ex radicibus cichor.
fragor. fol. nasturt. aquat. agrimon. et
fumariae cum rhab. frustuloque carnis
vitulinae, aut pullo gallinaceo, con-
fecta. Immo, si pacatus sit sanguinis
fervor, plantae vulnerariae adjungen-
dae, ut bugul. veronic. fanicul.

2do, Jusculis modo dictis succe-
dere debet lactis usus: quod si asini-
num aut caprinum fuerit, crudum;
si vero vaccinum, coctum usurpetur:
coquatur

coquatur autem cum decocto capill.
vener. vel theae; vel, si res ita ferat,
cum decocto herbarum vulnerariarum,
ut chinae farfap. &c. Post lactis usum,
praescribendae sunt misturae absor-
bentes, exsiccantes vel vulnerariae,
ex oculis cancrorum coral. rub. san-
guine dracon. pulp. cassiae, et balf.
capiu. quae horâ ante decubitum, vel
mane ante lactis usum, deglutienda
sunt. Quod si remedium horumce
usu sanguinis crasis dissolvatur, ulcus
uteri ope injectionum detergi possit;
et convenient tunc temporis ptisanæ
sudorificæ, vel decocta ex radicibus
lignorum parata. Sed hæc methodus
tantummodo utilis est, cum sanguinis
massa colluvie serosa laborat, quæ ul-
ceris cicatricationi obstat: contra, si
ficcior fuerit sanguinis diathesis, usu
aq. min. diluenda est; inter quas po-
tissimum laudantur aquae tepidæ.

Uteri

Uteri ulcus, 1mo, Injectionibus demulcendum. 2do, Detergendum. 3tio, Astringentibus leviter coercendum. 4to, Epuloticis exsiccandum. Itaque,

1mo, Si dolor gravis urgeat, immit-tendae sunt injectiones in uterum ex decoct. emollient. ; debent quoque enemata, eodem modo parata, injici. Frequenter debet autem utrumque genus remedii per plures dies iterari.

2do, Mitigato semel uteri dolore, detergentes injectiones usurpandae, ex decocto hordei cum mel. rosar. vel aq. therm.

3tio, Post sufficientem detergentium usum, refrigerantibus utendum est, nempe injectionibus cum hord. ros. rub. burs. pas. et radice symphat. maj. ; quibus tamen caute insistendum est.

4to, Tandem, astringentia, cum turia ceruss. ung. de pomp. thereb. cocta, mire profunt.

